

"生達"敵芬尼朵 糖衣錠

"Standard"Diphenidol S.C.Tablets

衛署藥製字第 015078 號 Code.No.TD-07 2211280

近年來，由於生活環境之複雜化，及因交通事故遭殃之頭部外傷及其後遺症之急增，訴苦"眩暈"之患者有一直增加之趨向，如今"眩暈"已成爲現代病之一，今日對於"眩暈"之治療劑，不但須由臨床藥理學上之立場，更須由實驗藥理學之立場加以探討研究，本劑主成分 Diphenidol 即依據此理論推出之新藥。

本劑之作用乃在前庭神經核 level 遮斷由末梢前庭神經進入之異常刺激，而在中樞左右前庭神經 level 保持平衡，並能改善腦幹部循環動態，特別對於患側之椎骨動脈異常緊張，顯示緩解作用而增加血流使健側與患側之血流趨於平衡，因此本品乃爲治療平衡障害症候群最有效力之製劑。

「成分」：每錠含：

Diphenidol HCl 25mg

「作用及特長」：

- 1.改善椎骨腦底動脈之循環不全：本品對患側椎骨動脈之血管攣縮具有選擇性緩解作用，能除去患側與健側之血流量不平衡現象。
- 2.調整前庭神經路之機能：本品能在前庭神經核 level 遮斷由末梢前庭神經進入之異常刺激，更能在高位前庭性視床下部抑制刺激之傳達。
- 3.抑制異常眼振。

「適應症」：

因內耳障礙引起之眩暈(包括腦血管障礙及頭頸部外傷後遺症之眩暈)Meniere's disease 症候群。

「用法用量」：

通常成人 1 回 1~2 錠，1 日 3 回經口投與，可依年齡症狀適宜增減之(飯後投與)。

本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」：

1.對藥物過敏之病人及腎機能有重篤障害者不宜使用。

2.使用本劑時若有口渴、胸部灼熱感、散瞳、動悸等症狀出現宜減藥量或停藥。

另在外國曾有發疹、不舒服感、頭痛、傾眠等症狀出現之報告。

「副作用」：

在一般臨床試驗中曾有口渴、胸部灼熱感、散瞳、動悸等症狀之出現，惟經減藥量或停藥等處置後即消失。在全臨床試驗過程中所作一般臨床檢查、肝機能檢查、腎機能檢查、血液檢查並無觀察到涉及組織變性或器質異常之副作用。

「包裝」：

100 錠盒裝，100 錠，500 錠，1000 錠瓶裝。



GMP 藥廠 ISO9001

生達化學製藥股份有限公司

臺灣省台南縣新營市土庫里六號之二十